

Dépression respiratoire des morphiniques

Informations patient:

Homme âgé de 65 ans, transféré de réanimation vers un service de chirurgie générale et digestive.

Le patient a été admis dans le service 2 jours après une colectomie subtotale avec rondes d'observations toutes les 4 heures.

Rondes et Score NEWS:

Jour 3 03:58 Morphiniques
Jour 3 05:32 Saturation en O₂ basse

Notifications Sensium®:

Jour 3 05:21 Alerte FR basse (7)

Action clinique:

De la morphine a été administrée pour le traitement de la douleur post-opératoire. L'infirmière a poursuivi ses rondes et a reçu une notification de FR basse 90 minutes après son passage.


Après revue, il a été confirmé que la saturation en oxygène du patient était basse et le patient était somnolent. Une dépression respiratoire des morphiniques a été suspectée et le patient a été vu par un médecin. De la naloxone a été prescrite pour contrer les effets de la morphine.

Conclusion:

Le patient était en chambre individuelle et dans l'incapacité d'appeler le personnel infirmier. La notification Sensium® a permis à l'infirmière de le voir 2h30 avant la prochaine ronde. S'il n'avait pas été pris en charge aussi tôt, cet épisode de dépression respiratoire des morphiniques aurait été plus grave pour le patient.

Notification Sensium®

05:21 – FR basse soutenue
(7)



Morphiniques

Morphine administrée pour le traitement de la douleur post-opératoire.

Observations

05:32 Patient somnolent, confirmation saturation en oxygène basse, information au médecin.

Action

06:32 Administration de Naloxone pour contrer les effets de la morphine prescrite.