

Sepsis, protocole de prise en charge du sepsis initié

Informations patient:

Homme âgé de 69 ans, admis suite à une résection recto sigmoïdienne.

Le patient est resté 4 jours en hospitalisation avec rondes d'observations toutes les 4 heures.

Rondes et Score NEWS:

Jour 4 16:01 NEWS 2

Jour 4 20:08 NEWS 6

Notifications Sensium®:

Jour 4 17:39 Alerte FR élevée (26)

Action clinique:

Suite à la notification Sensium®, les courbes de tendance du patient ont été revues et le protocole de prise en charge du sepsis a été initié.

La notification Sensium® est survenue 2 heures avant la prochaine ronde d'observation et lorsque le patient pouvait encore être traité dans le service sans nécessiter un transfert en soins intensifs.


Conclusion:

Patient stabilisé et retour à domicile dans les jours qui ont suivi.

Notification Sensium®

17:39 – FR élevée soutenue (26)

Note : Les FC, FR et T ont toutes commencé à dévier au même moment, permettant aux cliniciens d'initier le protocole de prise en charge du sepsis 2 heures avant la prochaine ronde d'observation.



Ronde et Score NEWS
16:01 NEWS 2

Ronde et Score NEWS
20:08 NEWS 6